



Männer werden aktiv. Früherkennung bei Prostatakrebs ist möglich.

Das PSA (Prostata Spezifisches Antigen) ist ein sehr wichtiger Marker zur Beurteilung der Prostatagesundtheit.

... und so geht's:

Bitte den t-PSA-Wert (Gesamt-PSA) und den f-PSA-Wert (freier PSA) nach jeder Untersuchung in die Tabelle eintragen. Den t-PSA-Wert auch als Punkt in das Diagramm »Verlauf des Gesamt-PSA« übertragen. Der Verlauf und ein eventueller Gesamt-PSA-Anstieg sind für die Beurteilung durch den Hausarzt/Urologen sehr wichtig.

PSA-PASS Früherkennung Prostatakrebs



Von

Versicherungsnummer
Geburtsdatum

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresse

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefon/fax

Email

VORARLBERGER SELBSTHILFE PROSTATAKREBS www.vsprostatatakrebs.at

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

| Verlauf des Gesamt-PSA = t PSA (ng/ml) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zur Vorsorgeuntersuchung mitnehmen, Werte eintragen
und im Gesundheitsordner ablegen.

Arzt

| Datum | t-PSA
(ng/ml) | f-PSA
% | Arzt |
|-------|------------------|------------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |